

SUNNY® 5 SC

Fitorregulador - Suspensión Concentrada (SC)

Fitorregulador de crecimiento de las plantas utilizado para disminuir el crecimiento vegetativo y mejorar la forma calidad del fruto, además de aumentar el rendimiento por un aumento en la cuaja de los frutos de Paltos.

Composición:

Uniconazol-p.....5% p/v (50 g/l)
Cofomulantes, c.s.p.....100% p/v (1 l)
*(E)-(RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H,1,2,4-triazol-1-il)-pent-1-en-3-ol

Lote:

Fecha de Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4188

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Fabricado por: **Adama Agan Ltd**
Northern Industrial Zone
P.O.B. 262 Ashdod 77102
Israel

Distribuido por: **ANASAC CHILE S.A**
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Importado por: **Valent BioSciences Chile S.A.**
Av Kennedy 5735 Of 1601,
Torre Poniente, Las Condes,
Santiago-Chile Fono:
(56)228350500



Contenido neto: 5 Litros

© Marca Registrada

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• Uniconazol-p pertenece al grupo químico de los triazoles. • Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Conservar en su envase de origen y bajo llave. • Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación, use guantes impermeables, botas de goma, protector facial, overol impermeable. Durante la aplicación, use guantes impermeables, botas de goma, protector facial, overol impermeable. • No comer, no fumar ni beber durante el uso del producto. • No aplicar con viento y no trabajar en la neblina de la aplicación. Aleje animales y personas extrañas. • Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.

Síntomas de intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, sudor, salivación, opresión en el pecho, visión borrosa y malestar general. El producto puede resultar irritante a los ojos.

Primeros Auxilios:

En caso de "**contacto con los ojos**": Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Obtenga asistencia médica si hay irritación.

En caso de "**inhalación**": Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial y buscar asistencia médica inmediatamente.

En caso de "**ingestión**": **NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Buscar asistencia médica inmediatamente para tratamiento adecuado.

En caso de "**contacto con la piel**": Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Obtenga asistencia médica si hay irritación

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Riesgos Ambientales: Tóxico a peces y fauna marina. No tóxico aves y abejas. No contamine cursos de agua
"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES". "PARA APLICACIONES AERÉAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Instrucciones para Triple Lavado: Una vez vacío el envase, agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de Emergencia: Valent BioSciences Chile S.A.: (56)228350500 / CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)226353800 (**Atención las 24 horas**)
CITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

SUNNY® 5 SC es un fitorregulador utilizado en patlos, para disminuir el crecimiento vegetativo, mejorar la forma calidad del fruto, favoreciendo el aumento de rendimiento por un aumento en la cuaja de frutos.

| Cultivo | Objetivos | Dosis | Observaciones(*) |
|------------------------------------|--|---|---|
| Palto (Aplicación en primavera) | Mejorar tamaño de la fruta, reducir crecimiento vegetativo y mejorar la cuaja de los frutos. | Aplicación terrestre: 0,5 – 1,0 L/100 L agua Aplicación aérea: 2,0 – 3,0 L/ha | Aplicar en floración. No aplicar con fruta presente. En aplicaciones terrestres utilizar 500-800 L agua/ha y en aplicaciones aéreas 20-60 L agua/ha, dependiendo del tamaño de los árboles. Utilizar las dosis mayores en caso de árboles que presenten un alto vigor y alto crecimiento vegetativo. Realizar una aplicación por temporada. |
| Palto (Aplicación en otoño) | Reducir crecimiento vegetativo y aumentar la producción de flores en la primavera siguiente. | Aplicación terrestre: 0,5 – 1,0 L/100 L agua Aplicación aérea: 2,0 – 3,0 L/ha | Realizar la aplicación cuando los brotes tengan 10 a 15 cm. Repetir a los 14 días según las condiciones del huerto. En aplicaciones terrestres utilizar 500-800 L agua/ha y en aplicaciones aéreas 20-60 L agua/ha, dependiendo del tamaño de los árboles. Utilizar las dosis mayores en caso de árboles que presenten un alto vigor y alto crecimiento vegetativo. Realizar máximo dos aplicaciones por temporada. |

(*) No aplicar en condiciones de alta temperatura. En aplicaciones terrestres, utilizar equipo pulverizador convencional, bien calibrado y procurar una buena distribución del producto.

Preparación de la mezcla: Disolver la cantidad necesaria de **SUNNY® 5 SC** en el estanque del equipo aplicador lleno hasta la mitad con agua y con el agitador funcionando. Luego completar con agua sin dejar de agitar.

Fitotoxicidad: **SUNNY® 5 SC**, no presenta fitotoxicidad cuando es utilizado según las recomendaciones de esta etiqueta.

Incompatibilidad: **SUNNY® 5 SC** no presenta incompatibilidades, sin embargo se recomienda no aplicar junto con plaguicidas.

Compatibilidad: **SUNNY® 5 SC** es compatible con coadyuvantes organosiliconados.

Períodos de Carencia: No corresponde.

Para cultivos de exportación respete las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso: Para personas 4 horas. Para animales no aplica dado que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Nota al Comprador: Las recomendaciones de uso así como la información de esta etiqueta, son el resultado de rigurosos y amplios estudios y pruebas. Sin embargo, numerosos factores más allá de nuestro control (preparación de las mezclas, condiciones climáticas, equipos de pulverización, etc.) pueden afectar el uso. La responsabilidad sobre daños producidos por un mal uso del producto o por aplicaciones diferentes a las recomendadas en la etiqueta son de absoluta responsabilidad del usuario. La compañía garantiza la calidad de la formulación, porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



CUIDADO

