

Nutrafol BORO 21

Descripción

Nutrafol Boro 21 es un polvo soluble a base de Octoborato de Sodio. Formulación muy eficaz en corregir el déficit de este elemento, en diferentes cultivos. Sus aplicaciones pueden realizarse tanto vía foliar como por fertirriego.

Composición

Boro (B): 21 % p/p

Parámetros físicos, químicos


pH: 8,6 Solubilidad a 20°C: 220 g/L Tamaño de Particula: <0,106 mm 52% 0,106-1,00 mm 47% >1,00 mm 0,1%

Recomendaciones de uso

Nutrafol Boro 21, es altamente eficaz en cualquier tipo de aplicación. En aplicación foliar considerar un buen cubrimiento. No mezclar con aceite. Para mayor seguridad, cuando se mezcle con otros productos químicos, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previamente.

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Uva de Mesa	1,5- 2,5 Kg/ há.	Realizar aplicación en preflor- ación e inicio de flor.
Carozos	1– 2 Kg/ há.	Aplicar desde botón floral a plena flor , en postcosecha con hojas activas , aumentar dosis a 3 – 4 kilos / ha.
Pomáceas	1,5- 2,5 Kg/ há.	Realizar aplicación desde ramillete floral expuesto a inicio de floración , en postcosecha duplicar dosis con hojas activas .
Paltos	1,5- 2,5 Kg/ há.	Aplicar en estado fenológico de panícula expuesta.
Cítricos	2-3 Kg/ há.	Aplicar en hortalizas de frutos antes de la floración .
Hortalizas	1 Kg/ há.	Aplicar en hortalizas de frutos antes de la floración. En cultivos según análisis y requerimientos.
Nogales y Avellanos	2 Kg/ há.	Aplicar desde Inicio floración y post cosecha con hojas activas.
Arándanos, Frutillas y Frambuesas	0,5 - 0,75 Kg/ há.	Aplicar en botón floral.
Dosis vía riego entre 10 a 20 Kg/há, dependiendo del conteni-		

Dosis vía riego entre 10 a 20 Kg/há, dependiendo del contenido de boro del suelo



Precauciones de Aplicación

- El producto debe ser almacenado en su envase de origen y debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en un lugar con adecuada ventilación.
- La manipulación del producto requiere utilizar en forma obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.
- Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo las normativas existentes de triple lavado.
- En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
- Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo que fueron expuestas.
- Mantener el producto en permanente agitación.
- Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la aplicación.
- Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los cultivos.

Advertencias

Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc., las cuales puedan generar eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al fabricante.

El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos de Fertilizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el usuario debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.

